ПРИБАВЛЕНІЕ

КЪ НИЖЕГОРОДСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

ВѢДОМОСТЯМЪ

№ 20.

ИЗВѢСТІЯ.

1. Наблюденія надъ причиною головокруженія у овецъ, и о предполагаемыхъ средствахъ къ устраненію этого недуга.

Убѣдясь всѣми хозяйственными вычетами, что никакое скотоводство не можетъ приносить столько пользы помѣщику, какъ овцеводство (разумѣя при этомъ породу овецъ, сообразную климату), а развожу у себя въ имѣніи стадо овецъ Черкасской породы. Онѣ содержатся у меня зимою почти на Азіатскій манеръ: въ холодномъ хлѣвѣ, сдѣланномъ съ наружной стороны изъ бревенъ въ столбы, и проконопаченомъ извнѣ соломой; съ внутренней, или надворной, изъ плетня, защищаемаго иногда съ этой стороны, въ суровыя зимы, соломенными щитами; безъ потолка, съ соломенною крышею. Къ хлѣву особо пристроенъ выгонъ изъ жердей, въ столбы по три жерди въ каждомъ пряслѣ, переплетенныхъ стоймя, весьма плотно, высокимъ хворостомъ, для защиты отъ холодныхъ вѣтровъ, куда и выпускаютъ ихъ во всѣ ясные зимніе дни, и загоняютъ на ночлегъ съ пастбища. Кормъ зимою задается въ ясли, хотя и безъ вѣса, но въ достаточномъ количествѣ, и всегда въ одно время, по три раза въ день: по утру солома, яровая или ржаная, всегда свѣжая; въ полдни и на ночь хорошее сѣно. Припускъ барановъ дѣлается 20 Ноября, по 15 овецъ на одного барана; ягненье начинается 13—15 Апрѣля, такъ, чтобы ко времени выгона въ поле, все стадо могло выйти уже съ ягнятами. Во время ягненья, объяг-

нившіяся овцы немедленно отбираются въ особый хлѣвъ, гдѣ уже и идетъ имъ особое содержаніе, и имянно: по утру и въ вечеру сѣно, обрызгиваемое солевою водою, а въ полдни по одному фунту овса на каждую матку, къ которому однакоже ягнята, какъ по недостатку для нихъ мѣста въ корытахъ между ихъ матками, такъ и по чрезмѣрной еще молодости и слабосилію своему, вовсе не дотрогиваются; также и сѣна, по той же причинѣ, почти ѣсть не могутъ. Такое содержаніе матокъ продолжается не болѣе двухъ, трехъ недѣль, покуда переягнится все стадо, и выйдетъ на подножный кормъ. Поятъ ихъ всегда колодезною водою, прямо изъ колодца наливаемую, безъ всякой подогрѣвки. Лѣтомъ пасутся онѣ на особой отведенной степной пустоши, совершенно сухой, чрезъ которую протекаетъ рѣчка чистой воды.

При такомъ содержаніи, въ теченіе 6 лѣтъ мое овечье стадо не подверглось ни оспѣ, ни другимъ какимъ значительнымъ болѣзнямъ, кромѣ одной непостижимой, и ни какимъ лечебнымъ средствамъ не уступающей болѣзни, именно головокруженію, отъ котораго каждогодно умираетъ у меня отъ 10 и до 15, большею частію, годовалыхъ овецъ.

Разныя средства и изысканія причинъ, въ истинно-благодѣтельной Земледѣльческой газетѣ описанныя, по малой успѣшности ихъ, свидѣтельствовали только, что настоящая причина болѣзни еще ненайдена; но извлеченіе изъ статьи Ветеринарнаго врача г. Куерса, въ № 68—1838, возбудило во мнѣ любопытство, удостовѣриться лично въ происхожденіи этой болѣзни отъ образующагося въ головѣ овцы водянаго пузыря, что тѣмъ болѣе подстрекнуло мою любознательность, что болѣзнь эта, по мнѣнію его, происходитъ „отъ слиш„комъ питательнаго, сухаго и особен„но зерноваго корма, вовсе не свойственнаго возрасту ягнятъ.“ У меня ягнята, въ первыхъ недѣляхъ своего возраста, такимъ кормомъ вовсе не имѣютъ возможности питаться, а далѣе, переходятъ съ матками прямо на траву; да и самыя матки ихъ, во время зимы хотя и достаточно получаютъ добраго сѣна и соломы, но все-таки не бываютъ въ это время года столько жирны, чтобы могли отъ того полнокровѣть и имѣть причину къ зарожденію ягнятъ съ болѣзненнымъ предрасположеніемъ. По этому сомнѣнію, я самъ принялся за анатомированіе овечьей головы, и не одной, а нѣсколько вскруженыхъ головъ. *Въ первой*, подъ мозговою плѣной, къ носовой части, оказались два водянистыхъ пузыря, наполненные самою прозрачною жидкостью, не имѣющею ни какого запаха; по-ниже ихъ, въ обѣихъ носовыхъ полостяхъ у самой мозговой плены, по выше внутреннихъ глазныхъ угловъ, въ одной сторонѣ 4, а въ другой 3 живыхъ червяка. Нѣкоторые изъ нихъ были

длиною съ полвершка, а другіе гораздо меньше, и какъ видно, недавно зародившіеся; цвѣтомъ, одни всѣ бѣлые, а другіе съ зеленобурыми кольцами, которыхъ у большихъ, у каждаго, по десяти, съ раздвоеннымъ рыльцамъ, и въ верхней его части двумя, въ видѣ черныхъ точекъ, глазами, или, можетъ быть, питательными сосцами, цилиндрическимъ, сверху полукруглымъ, а въ нижней подбрюшной части плоскимъ туловищемъ. *Во второй*: въ правой носовой полости, выше внутренняго глазнаго угла, 4 червяка, и надъ ними, къ этой же сторонѣ, подъ мозговою плевою водянистый пузырь. *Въ третьей*. 3 червяка въ томъ же самомъ мѣстѣ съ лѣвой стороны, и надъ ними въ той же сторонѣ водяной пузырь.

(*Окончаніе въ слѣд. №.*)

2. О пріѣхавшихъ и выѣхавшихъ:

(*съ 4-го по 11 число Мая 1840 года.*)

Прибыли: изъ Балахны — Подполковникъ *Гриневичъ*, изъ Арзамаса — Ротмистръ и отс. Штабсъ Ротмистръ Князья *Звенигородскіе*, изъ Бѣлостока — Титулярный Совѣтникъ *Рачко*, изъ Арзамаса — отс. Штабсъ-Ротмистръ *Чемодановъ*, изъ Иркутска — Подпоручикъ *Вишневскій*, изъ Харькова — Подпоручикъ *Тимашевскій*, изъ Москвы — Титулярный Совѣтникъ *Ловяницкій* и Чиновникъ 12 класса *Новиковъ*, изъ Барнаула — Чиновникъ 13 класса *Галдобинъ*, остановились Кремлевской части, изъ Балахны — Штабъ Лекарь *Никифоровъ*, изъ Сапожка — Поручикъ *Олондеръ*, изъ Чухломы отс. Подпоручикъ *Кодниковъ*, изъ Москвы — Чиновникъ 12 класса *Федоровъ*, остановились Рождественской части.

Выѣхали: въ С. Петербургъ — Статскій Совѣтникъ *Месингъ*, въ Балахну — Подполковникъ *Гриневичъ*, въ Москву — Чиновникъ 12 класса *Новиковъ*, въ С. Петербургъ — Подпоручикъ *Вишневскій*, Чиновникъ 13 класса *Галдобинъ* и Коллежскій Регистраторъ *Шварцъ*, въ Ярославль — Коллежскій Регистраторъ *Виноградовъ*.

Метеорологическія наблюденія дѣланныя при Нижегородской Губернской Гимназіи съ 28-го Апрѣля по 5 число Мая 1840 года.

Дни мѣсяца по старому штилю.	9 часовъ утра.				полдень.				3 часа по полудни.				9 часовъ вечера.			
	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термометръ. При барометрѣ.	Термометръ. Реомюра на воздухѣ	Направленіе и сила вѣтра и состояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термометръ. При барометрѣ.	Термометръ. Реомюра на воздухѣ	Направленіе и сила вѣтра и состояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термометръ. При барометрѣ.	Термометръ. Реомюра на воздухѣ	Направленіе и сила вѣтра и состояніе неба.	Барометръ въ миллиметрахъ.	Термометръ. При барометрѣ.	Термометръ. Реомюра на воздухѣ	Направленіе и сила вѣтра и состояніе неба.
28.	747,3.	20,7.	*14,6	юв, 3 м, облана	746,9.	21,2.	*16,0	юв 2. м. облака.	746,2	20,6	*18,8	юв 2 м облака.	744,4.	18,9.	*12,9	Тихо чисто.
29.	742,4.	19,6.	11,7.	Тихо п, и дождь;	743,0	20,3	14,0	Тихо покры	744,0.	20,0	12,8.	Тихо облачно.	745,9.	18,4.	11,0.	в. 1. покры.
30.	750,3	18,0.	13,4.	в, 1, покры.	749,2	18,5	9,9.	в. 1. облачно.	748,9	18,3.	18,4.	в. 1; покры	746,7	18,5.	9,0.	юв. 2 м облака.
Мая 1.	744,6.	19,4.	14,1.	юз. 2, облачно	743,2	19,2.	18,8.	юз. 2. покры.	742,6.	19,5.	17,4.	в. 3. покры.	741,9.	19,0.	10,7.	в. 1. облачно.
2.	739,8.	17,6.	7,0.	сз, 2 облачно	740,3.	18,0	4,6.	сз. 4. п. и дождь	743,9.	18,3.	2,4	сз 4. п. и с нѣгъ.	748,2.	17,3.	0,0.	с. 4. покры.
3.	750,2.	18,3.	-0,4.	с. 4 м. облака,	750,0.	18,0	1,4.	с. 4. м. облака.	749,9.	17,5.	1,4.	с. 4 облачно.	751,7.	16,6.	0,2.	с. 4. покры.
4.	750,6.	17,8.	*4,0.	с. 4. чисто.	748,5.	17,9	6,4.	с. 4. облачно.	746,9.	18,0.	8,5.	с. 4. облачно	748,1.	17,5.	15,0.	с, 2 чисто.

Наблюдатель, Старшій учитель Гимназіи, Георгій Штейнъ.